

**Service des patrimoines
Bureau de la politique documentaire**

Personne chargée de la recherche :
Nathalie NIZAN

Allaitement : recherche documentaire

Destinataires : Marie-France DACREMONT, Sophie
RUBIO-GURUNG (HCSP)

Projet : liste de références documentaires

Version : 07/03/2024

Cette recherche documentaire sur l'allaitement maternel est demandée par le Haut Conseil de la santé publique, en complément de la recherche effectuée sur les contaminants dans le lait maternel et dans le cadre du sous-groupe « promotion de l'allaitement ». Elle porte sur :

- le gradient social de l'allaitement
- les freins et barrières à l'allaitement
- la mort subite du nourrisson et l'allaitement
- les positions féministes et l'allaitement
- la césarienne et l'allaitement
- la dépression du post-partum et l'allaitement
- les lieux publics et l'allaitement

Les pays retenus pour les deux premières thématiques sont la France et l'Europe et au-delà pour les autres.

Les types de documents demandés sont des articles scientifiques principalement. La période couverte est de 20 ans.

Gradient social de l'allaitement

- ❖ Effectiveness of a community-based support programme to reduce social inequality in exclusive breastfeeding : study protocol for a cluster-randomised trial. 2023.

Le lait maternel est l'alimentation idéale pour les nourrissons, et l'allaitement protège les nourrissons et les mères d'une série de problèmes de santé. Au Danemark, la plupart des mères commencent à allaiter, mais beaucoup arrêtent au cours des premiers mois, ce qui fait que seulement 14 % d'entre elles atteignent la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé de six mois d'allaitement exclusif. Par ailleurs, la faible proportion d'allaitement à six mois se caractérise par une inégalité sociale marquée.

[Voir.](#)

- ❖ Influence of social determinants of health on breastfeeding intent in the United States. 2023.

Les taux d'allaitement aux États-Unis sont sous-optimaux malgré les recommandations de santé publique selon lesquelles les nourrissons doivent être nourris au lait maternel pendant leur première année de vie. Cette étude visait à caractériser l'influence des déterminants sociaux de la santé sur la durée prévue de l'allaitement.

[Voir.](#)

- ❖ Mapping inequalities in exclusive breastfeeding in low - and middle - income countries, 2000-2018. 2021.

L'allaitement maternel exclusif (EBF) - donner aux nourrissons uniquement du lait maternel pendant les 6 premiers mois de leur vie - est une composante des pratiques optimales d'allaitement maternel efficaces pour prévenir la morbidité et la mortalité infantiles. On sait que les pratiques d'EBF varient selon la population et des estimations infranationales comparables de la prévalence et des progrès dans les pays à revenu faible et intermédiaire sont nécessaires pour planifier les politiques et les interventions.

[Voir.](#)

- ❖ Trends and inequalities in breastfeeding continuation from 1 to 6 weeks : findings from six population-based British cohorts, 1985–2010. 2021.

Comprendre les inégalités dans les pratiques d'allaitement peut aider à expliquer les taux d'allaitement constamment faibles au Royaume-Uni. Une étude récente utilisant les enquêtes quinquennales sur l'alimentation des nourrissons (IFS) au Royaume-Uni a révélé que les inégalités sociodémographiques dans l'initiation à l'allaitement maternel persistaient entre 1985 et 2010. La présente étude examine les inégalités sociodémographiques dans la poursuite de l'allaitement 6 semaines après la naissance chez les mères qui ont commencé et maintenu l'allaitement à une semaine en 1985-2010.

[Voir.](#)

- ❖ The impact of socio-demographic factors on breastfeeding : findings from the “Mamma & Bambino” cohort. 2021.

La présente étude vise à évaluer le statut d'allaitement et les principaux facteurs maternels associés à l'allaitement exclusif pendant six mois chez les femmes de l'étude « Mamma & Bambino », une cohorte prospective installée à Catane, en Italie.

[Voir.](#)

- ❖ Infant formula consumption is positively correlated with wealth, within and between countries : a multi-country study. 2020.

Contrairement à l'abondante littérature sur les inégalités au sein des pays et entre les pays en matière de pratiques d'allaitement, il n'existe pas d'analyses multi-pays des disparités socio-économiques en matière de consommation de substituts du lait maternel dans les pays à revenu faible et intermédiaire.

[Voir.](#)

- ❖ Breastfeeding trends by race/ethnicity among US children born from 2009 to 2015. 2019.

Objectif : Examiner les tendances en matière d'allaitement par race/origine ethnique de 2009 à 2015 et les changements dans les écarts en matière d'allaitement en comparant les sous-groupes raciaux/ethniques avec les nourrissons blancs de 2009-2010 à 2014-2015.

[Voir.](#)

- ❖ Socio-economic status and maternal BMI are associated with duration of breast-feeding of Norwegian infants. 2018.

Objectif : Explorer s'il existe une association entre le statut socio-économique et l'IMC maternel et la durée de tout allaitement maternel/allaitement maternel exclusif chez les nourrissons norvégiens âgés de 4 et 5 mois en 2016.

[Voir.](#)

- ❖ Poverty and breastfeeding : comparing determinants of early breastfeeding cessation incidence in socioeconomically marginalized and privileged populations in the FiNaL Study. 2017.

Les différences en matière d'alimentation des nourrissons sont fortement liées au statut socio-économique. Le but de cette étude est de comparer les déterminants de l'incidence de l'arrêt précoce de l'allaitement maternel dans les populations socio-économiquement marginalisées et socio-économiquement privilégiées, en se concentrant sur les parents biologiques qui avaient l'intention d'allaiter.

[Voir.](#)

- ❖ Explaining socioeconomic inequalities in exclusive breast feeding in Norway. 2017.

Dans les pays à revenu élevé, une position socio-économique inférieure est associée à des taux d'allaitement maternel inférieurs, mais on ne sait pas exactement quels facteurs expliquent cette inégalité. Notre objectif était d'examiner l'association entre la position socio-économique et l'allaitement maternel exclusif, et d'explorer si les inégalités socio-économiques dans l'allaitement maternel exclusif pouvaient s'expliquer par d'autres caractéristiques sociodémographiques, par exemple l'âge et la parité de la mère, les habitudes tabagiques, les caractéristiques de naissance, la qualité du conseil et les difficultés d'allaitement.

[Voir.](#)

- ❖ Gaps in health and wealth : the relationship between trends in income inequality and breastfeeding inequalities. 2017.

L'objectif de cette étude est de déterminer si les inégalités en matière d'allaitement ont augmenté entre 1984 et 2014 et d'examiner si les tendances en matière d'inégalités de revenus sont liées aux inégalités en matière d'allaitement.

[Voir.](#)

- ❖ Early childhood development and the social determinants of health inequities. 2015.

Les résultats en matière de santé et de développement des enfants suivent un gradient social : plus on se situe dans l'échelle socio-économique, meilleurs sont les résultats. Basé sur un examen de multiples formes de preuves et avec un accent particulier sur l'Australie, cet article étudie les causes de ces inégalités socialement produites, leur impact sur la santé et le développement au cours des premières années et ce qui permet de réduire ces inégalités.

[Voir.](#)

❖ **Alimentation et inégalités sociales de santé en France. 2013.**

Dès le début de la vie, l'alimentation peut contribuer aux inégalités sociales de santé. L'abandon progressif de l'allaitement maternel et le raccourcissement de sa durée est une tendance générale, mais elle est plus souvent observée dans les foyers de faible PSE. Dans ces foyers, la faible prévalence d'allaitement maternel est associée à une utilisation à la fois trop précoce et trop prolongée de lait de vache (inadapté aux besoins du nourrisson car à la fois trop riche en protéines et pas assez riche en lipides, trop pauvre en fer), ainsi qu'à une diversification.

[Voir.](#)

❖ **Effects of socioeconomic status on breastfeeding duration in mothers of preterm and term infants. 2007.**

La propension à allaiter n'est pas seulement importante en ce qui concerne les effets bénéfiques sur l'individu, mais est également préoccupante en tant qu'indicateur du comportement de santé lié aux conditions sociales. Ainsi, notre objectif était d'étudier l'impact du statut socio-économique sur la durée de l'allaitement chez les mères de nourrissons prématurés et à terme.

[Voir.](#)

Freins et barrières à l'allaitement (méta-analyses et revues systématiques)

Allaitement, sevrage, congé maternité et reprise du travail

- ❖ Association between length of maternity leave and breastfeeding duration in the United States : a systematic review. 2024.

Les résultats montrent une relation positive entre la durée du congé de maternité et la durée de l'allaitement. Un plaidoyer en faveur d'un congé parental payé plus long et une recherche plus solide, ancrée dans des méthodes rigoureuses, sont nécessaires.

[Voir.](#)

- ❖ Length of maternity leave impact on mental and physical health of mothers and infants, a systematic review and meta-analysis. 2023.

Au total, 21 études ont été analysées. Il a été constaté qu'un congé de maternité plus long peut réduire les taux de problèmes de santé mentale et physique des mères. Il a également été constaté qu'un congé de maternité plus long entraîne des interactions mère-enfant plus positives, une diminution de la mortalité infantile et des périodes d'allaitement plus longues.

[Voir.](#)

- ❖ Predictors of breastfeeding duration on mothers who return to work : a systematic review. 2023.

L'idée de poursuivre l'allaitement et le travail soulève des exigences contradictoires pour la mère. Le travail est corrélé à l'arrêt précoce de l'allaitement maternel et le travail à temps plein est associé à une durée d'allaitement plus courte que le travail à temps partiel.

[Voir.](#)

- ❖ Factors associated with breastfeeding abandonment in the first month after the mother's return to work. 2023.

Le retour au travail des mères allaitantes a été identifié comme un facteur de risque important d'interruption de l'allaitement. Nous avons proposé d'identifier les facteurs associés à l'abandon de l'allaitement dans le premier mois après le retour.

[Voir.](#)

- ❖ Breastfeeding after returning to work : a systematic review and meta-analysis. 2021.

Les avantages de l'allaitement maternel sont largement connus ; cependant, la poursuite après le retour au travail ne l'est pas. Notre objectif était de mener une revue systématique et une méta-analyse pour évaluer la prévalence de l'allaitement maternel après le retour au travail.

[Voir.](#)

- ❖ Breastfeeding at the workplace : a systematic review of interventions to improve workplace environments to facilitate breastfeeding among working women. 2021.

Le but de cette étude est d'examiner les interventions sur le lieu de travail visant à promouvoir, protéger et soutenir les pratiques d'allaitement maternel parmi les mères qui travaillent dans le monde.

[Voir.](#)

- ❖ Women's and employers' experiences and views of combining breastfeeding with a return to paid employment : a systematic review of qualitative studies. 2021.

Le retour à un emploi rémunéré est l'une des raisons pour lesquelles les femmes arrêtent d'allaiter plus tôt qu'elles ne l'avaient prévu. Cette revue systématique visait à fournir un aperçu des expériences et des points de vue des femmes et des employeurs sur l'allaitement maternel et le retour à un emploi rémunéré, les résultats étant utilisés pour éclairer les pratiques et les politiques.

[Voir.](#)

- ❖ Workplace programmes for supporting breast-feeding : a systematic review and meta-analysis. 2021.

Objectif : Examiner de manière critique la littérature concernant les interventions en matière d'allaitement sur le lieu de travail et évaluer leur impact sur les indicateurs de l'allaitement maternel.

[Voir.](#)

- ❖ Maternity leave length impact on breastfeeding and postpartum depression. 2020.

En janvier 2016, le ministère américain de la Défense a augmenté la durée du congé de maternité payé pour les militaires en service actif de 6 semaines à 12 semaines. Notre étude vise à déterminer l'impact de la durée du congé de maternité sur la durée de l'allaitement et les taux de dépression post-partum chez les militaires en service actif.

[Voir.](#)

- ❖ Maternity leave and exclusive breastfeeding. 2019.

Objectif : Analyser l'association entre le congé de maternité et l'allaitement maternel exclusif et estimer la prévalence de l'allaitement maternel exclusif chez les enfants de moins de six mois.

[Voir.](#)

- ❖ Maternity leave and its impact on breastfeeding : a review of the literature. 2018.

L'objectif de cette revue est de synthétiser les données disponibles dans le monde entier sur l'association entre congé de maternité et durée de l'allaitement. Nous avons également l'intention de fournir un aperçu de la

question de savoir si cette association est différentielle selon le statut socio-économique.

[Voir.](#)

- ❖ Maternal employment, breastfeeding, and health : evidence from maternity leave mandates. 2008.

[Voir.](#)

- ❖ Length of maternity leave and health of mother and child - a review. 2007.

La nouvelle politique en Suisse étend le congé de maternité à 14 semaines pour un nombre considérable de femmes. Avec cette prolongation, on peut s'attendre à moins de symptômes dépressifs et à une durée d'allaitement plus longue, tandis que les bénéfices concernant d'autres résultats pour la santé justifieraient des congés plus longs.

[Voir.](#)

Allaitement et conditions de travail dans les maternités

- ❖ A qualitative analysis of women's postnatal experiences of breastfeeding supports during the perinatal period in Ireland. 2023.

Les sages-femmes agissent en tant que prestataires de soins primaires pour les femmes pendant la grossesse, l'accouchement, le travail et la période postnatale et elles sont formées pour fournir une assistance et un soutien à l'allaitement, selon les compétences décrites par le Nursing and Midwifery Board of Ireland. Cependant, des pénuries de personnel sont régulièrement signalées dans les maternités, ce qui limite probablement le temps dont disposent les sages-femmes pour fournir des soins et un soutien liés à l'allaitement.

[Voir.](#)

- ❖ Improving breastfeeding support through the implementation of the Baby-Friendly Hospital and Community Initiatives : a scoping review. 2023.

De meilleures pratiques d'allaitement maternel peuvent potentiellement sauver la vie de plus de 823 000 enfants de moins de 5 ans dans le monde chaque année. L'Initiative des hôpitaux amis des bébés (BFHI) est une campagne mondiale menée par l'Organisation mondiale de la santé et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, qui promeut les meilleures pratiques pour soutenir l'allaitement maternel dans les services de maternité.

[Voir.](#)

- ❖ Barriers and facilitators for exclusive breastfeeding within the health system and public policies from in-depth interviews to primary care midwives in Tenerife (Canary Islands, Spain). 2021.

Le but de cette étude est de décrire les perspectives des sages-femmes de soins primaires concernant les facteurs qui profitent ou sont préjudiciables à l'allaitement maternel exclusif (EBF) au sein du système de santé et des politiques publiques.

[Voir.](#)

- ❖ The supporting role of the midwife during the first 14 days of breastfeeding : a descriptive qualitative study in maternity wards and primary healthcare. 2019.

En Flandre, Belgique, 78,2 % des femmes allaitent exclusivement leur bébé après la naissance. Cependant, après trois mois, seulement un tiers de ces bébés sont allaités exclusivement au sein. Cela contraste avec les recommandations de l'OMS d'un minimum de six mois. Des études révèlent que les femmes ne sont pas toujours satisfaites du soutien à l'allaitement qu'elles reçoivent de leur sage-femme, ce qui peut conduire à un arrêt précoce de l'allaitement.

[Voir.](#)

- ❖ Education and training of healthcare staff in the knowledge, attitudes and skills needed to work effectively with breastfeeding women : a systematic review. 2017.

Les données actuelles suggèrent que les femmes ont besoin d'un soutien efficace pour allaiter, mais de nombreux personnels de santé manquent de connaissances, d'attitudes et de compétences nécessaires. Il existe donc un besoin d'éducation et de formation sur l'allaitement maternel pour le personnel de santé.

[Voir.](#)

- ❖ Impact of the baby-friendly hospital initiative on breastfeeding and child health outcomes : a systematic review. 2016.

L'Initiative des hôpitaux amis des bébés (BFHI) est un élément clé de la stratégie mondiale de l'Organisation mondiale de la santé et du Fonds des Nations Unies pour l'enfance pour l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. L'objectif principal de cette revue systématique narrative était d'examiner l'impact de la mise en œuvre de l'IHAB sur l'allaitement maternel et les résultats en matière de santé infantile dans le monde et aux États-Unis.

[Voir.](#)

- ❖ Midwives' experiences of helping women struggling to breastfeed. 2016.

L'étude a révélé que l'allaitement maternel a un impact émotionnel sur les sages-femmes. Ne pas pouvoir consacrer le temps dont elles estimaient que les femmes avaient besoin a affecté les sages-femmes. Avec les rapports faisant état d'une pénurie croissante de sages-femmes, on craint que le manque de temps ne s'aggrave, conduisant à un plus grand sentiment d'insatisfaction professionnelle.

[Voir.](#)

- ❖ 'Oh no, no, no, we haven't got time to be doing that' : challenges encountered introducing a breast-feeding support intervention on a postnatal ward. 2015.

Cette petite étude locale suggère que l'environnement et les conditions de travail dans un service postnatal britannique typique présentent des obstacles importants à l'introduction d'interventions de soutien à l'allaitement nécessitant une approche relationnelle des soins.

[Voir.](#)

- ❖ Midwives' time and presence : a key factor in facilitating breastfeeding support for new mothers. 2014.

Le temps et la présence des sages-femmes : un facteur clé pour faciliter le soutien à l'allaitement des nouvelles mères.

[Voir.](#)

- ❖ The role of the midwife in breastfeeding : dichotomies and dissonance. 2014.

La promotion de l'allaitement maternel peut créer une dissonance entre l'offre d'un choix éclairé et ce que les sages-femmes considèrent comme une coercition. La question du temps peut grandement miner le soutien des sages-femmes aux mères qui allaitent et les dichotomies entre la pratique fondée sur des données probantes et les expériences expérientielles/personnelles peuvent conduire à des soins inappropriés pour les mères qui allaitent.

[Voir.](#)

Freins et barrières à l'allaitement maternel

- ❖ Breast milk and breastfeeding : benefits, barriers, maternal predictors, and opportunities for innovation. 2022.

L'allaitement maternel a été associé à de meilleurs résultats en matière de santé infantile dans des études observationnelles, en particulier dans la population prématurée vulnérable. L'allaitement maternel est également bénéfique pour la santé maternelle à court et à long terme, une durée d'allaitement plus longue étant associée à des taux plus faibles de syndrome métabolique et de tumeurs malignes. Malgré ces avantages, plus de 60 % des femmes américaines n'atteignent pas leurs objectifs en matière d'allaitement. Des recherches supplémentaires sont nécessaires sur les fondements sociaux et biologiques des résultats de la lactation.

[Voir.](#)

- ❖ Examining supports and barriers to breastfeeding through a socio-ecological lens : a qualitative study. 2021.

Examiner les soutiens et les obstacles à l'allaitement maternel à travers une lentille socio-écologique : une étude qualitative.

[Voir.](#)

- ❖ A mixed-methods systematic review on barriers to exclusive breastfeeding. 2020.

L'Organisation mondiale de la santé recommande l'allaitement maternel exclusif pour chaque nouveau-né pendant les 6 premiers mois de la vie, mais les femmes rencontrent de nombreux défis pour le poursuivre. Cette revue systématique vise à identifier les obstacles à l'allaitement exclusif chez les mères.

[Voir.](#)

- ❖ Information and communication systems to tackle barriers to breastfeeding : systematic search and review. 2019.

L'objectif de cette revue est de fournir un aperçu complet des interventions numériques existantes qui soutiennent l'allaitement maternel en étudiant l'objectif des systèmes, la conception technologique, le processus de validation et les attributs de qualité, à la fois en termes de paramètres cliniques ainsi que de convivialité et d'expérience utilisateur.

[Voir.](#)

- ❖ Factors associated with breastfeeding initiation and continuation : a meta-analysis. 2018.

Utiliser une approche quantitative pour évaluer la littérature concernant la quantité, la qualité et la cohérence des études sur les caractéristiques maternelles et infantiles en association avec l'initiation et la poursuite de l'allaitement, et mener une méta-analyse pour produire un résumé des risques relatifs (RR) pour des facteurs sélectionnés.

[Voir.](#)

- ❖ Addressing barriers to exclusive breast-feeding in low- and middle-income countries : a systematic review and programmatic implications. 2017.

Malgré de nombreuses initiatives mondiales sur l'allaitement maternel, les données tendanciennes montrent que les taux d'allaitement exclusif (EBF) ont stagné au cours des deux dernières décennies. Le but de la présente revue systématique est de déterminer les obstacles à l'allaitement maternel exclusif dans vingt-cinq pays à revenu faible et intermédiaire et d'échanger sur les implications pour les programmes.

[Voir.](#)

- ❖ Breastfeeding as a public health responsibility : a review of the evidence. 2017.

Bien que l'intention d'allaiter soit élevée dans la culture occidentale, de nombreuses femmes arrêtent d'allaiter avant d'être prêtes. D'un point de vue physiologique, les taux d'insuffisance primaire en lait ou de contre-indications à l'allaitement devraient être faibles. Cependant, de nombreuses femmes se heurtent à de nombreux obstacles à l'allaitement, dont beaucoup surviennent au niveau social, culturel et politique et échappent donc au contrôle maternel.

[Voir.](#)

Mort subite du nourrisson et allaitement

- ❖ Community-based approaches to infant safe sleep and breastfeeding promotion : a qualitative study. 2023.

Aux États-Unis, les morts subites inattendues du nourrisson dues à la suffocation accidentelle et à l'étranglement au lit (ASSB) sont en augmentation, avec des disparités selon la race ou l'origine ethnique. Bien que l'allaitement maternel soit un facteur de protection contre la mortalité infantile, des disparités raciales et ethniques sont présentes dans son adoption, et les motivations à allaiter sont également souvent associées à des pratiques de sommeil infantiles non recommandées qui sont associées à des décès dus au sommeil chez les nourrissons.

[Voir.](#)

- ❖ Associations between breastfeeding and post-perinatal infant deaths in the U.S. 2023.

L'initiation de l'allaitement maternel a été associée à une réduction de la mortalité infantile post-périnatale. Bien que la plupart des États aient pris des initiatives pour protéger, promouvoir et soutenir l'allaitement maternel, aucune analyse de l'association entre l'allaitement maternel et la mortalité infantile n'a été menée au niveau des États et des régions.

[Voir.](#)

- ❖ Population-based survey showing that breastfed babies have a lower frequency of risk factors for sudden infant death syndrome than nonbreastfed babies. 2022.

L'allaitement maternel fournit la meilleure alimentation pour le nourrisson, et la proximité avec la mère est cruciale pour un allaitement réussi. Cependant, partager le lit des parents et dormir sur le ventre présente un risque élevé de syndrome de mort subite du nourrisson (SMSN). Il existe peu d'informations sur ces pratiques concernant la population espagnole.

[Voir.](#)

- ❖ Bedsharing may partially explain the reduced risk of sleep-related death in breastfed infants. 2022.

Des études ont montré que l'allaitement est associé à un risque plus faible de syndrome de mort subite du nourrisson (SMSN) et de mort subite inattendue du nourrisson (SUID), et l'association avec le SMSN est probablement causale.

[Voir.](#)

- ❖ Breastfeeding and post-perinatal infant deaths in the United States, a national prospective cohort analysis. 2022.

La réduction de la mortalité infantile est un objectif majeur de santé publique. L'impact potentiel de l'allaitement maternel sur la mortalité infantile n'est pas bien étudié aux États-Unis.

[Voir.](#)

- ❖ The role of breastfeeding in racial and ethnic disparities in sudden unexpected infant death : a population-based study of 13 million infants in the United States. 2022.

La mort subite et inattendue du nourrisson (SUID) affecte de manière disproportionnée les nourrissons noirs non hispaniques et amérindiens/autochtones d'Alaska, qui ont des taux d'allaitement inférieurs à ceux des autres groupes.

[Voir.](#)

- ❖ Unexpected death of an infant suffocated in the course of breastfeeding when the mother fell asleep. 2021.

La mort suite à une suffocation accidentelle due à une superposition est souvent négligée et encore attribuée au syndrome de mort subite du nourrisson. Nous rapportons un cas de mort subite d'un nourrisson suite à une suffocation accidentelle due à un chevauchement mammaire lors de l'allaitement.

[Voir.](#)

- ❖ Back to the breast : an historical overview of the perceived connections between sudden infant death syndrome and breastfeeding. 2020.

Dans l'histoire moderne de la mort subite du nourrisson aux États-Unis, l'allaitement maternel, en particulier, a été compris de manière variable comme une cause possible de mortalité infantile inutile dans les décennies entourant 1900 ; sans conséquence sur l'apparition du SMSN au milieu des années 1900 ; et enfin, comme un moyen important et sain de réduire le risque de SMSN à partir de la fin des années 1900.

[Voir.](#)

- ❖ An integrated analysis of maternal-infant sleep, breastfeeding, and sudden infant death syndrome research supporting a balanced discourse. 2019.

L'allaitement maternel et le lieu de sommeil de la mère et du nourrisson ont été controversés au niveau international en raison des inquiétudes concernant la mortalité infantile malgré les avantages connus de l'allaitement maternel exclusif et prolongé, qui sont accrus par l'allaitement nocturne.

[Voir.](#)

- ❖ Allaitement au sein et mort subite du nourrisson. 2018.

[Voir.](#)

- ❖ Breastfeeding and dummy use have a protective effect on sudden infant death syndrome. 2016.

Nous avons mené une revue de la littérature sur l'effet de l'allaitement maternel et de l'utilisation d'une tétine (sucette) sur le syndrome de mort subite du nourrisson.

[Voir.](#)

- ❖ Breastfeeding and sudden infant death syndrome. 2013.

[Voir.](#)

- ❖ Breastfeeding and reduced risk of sudden infant death syndrome : a meta-analysis. 2011.

Les avantages de l'allaitement maternel incluent un risque plus faible de mortalité postnéonatale. Cependant, il n'est pas clair si l'allaitement maternel réduit spécifiquement le risque de mort subite du nourrisson (SMSN), car les résultats des études sont contradictoires.

[Voir.](#)

- ❖ Does breastfeeding reduce the risk of sudden infant death syndrome? 2009.

Au cours des 20 dernières années, les campagnes de prévention visant à réduire le risque de mort subite du nourrisson ont connu un grand succès. Dans certains pays, le conseil d'allaiter est inclus dans les messages des campagnes, mais dans d'autres pays, ce n'est pas le cas.

[Voir.](#)

Positions féministes et allaitement

- ❖ Breastfeeding experiences and women's self-concept : negotiations and dilemmas in the transition to motherhood. 2023.

L'allaitement est bien plus qu'un événement biologique. Il s'agit d'une construction sociale, pleine de significations culturelles et encadrée par des structures sociales. Étant à la fois un événement naturel et une pratique sociale, l'allaitement maternel pose des défis aux approches féministes dans le sens où il peut être reconnu comme une pratique d'autonomisation des femmes et/ou comme un revers dans le processus d'émancipation sociale des femmes.

[Voir.](#)

- ❖ At the breast is best?' A corpus-informed feminist critical discourse analysis of the marginalisation of expressing human milk in online infant feeding promotional discourse. 2023.

[Voir.](#)

- ❖ "Breast is best"... until they say so. 2023.

[Voir.](#)

- ❖ Beyond public health and private choice : breastfeeding, embodiment and public health ethics. 2023.

L'objectif principal de cet article est de souligner l'importance de reconnaître l'allaitement maternel en tant que pratique sociale incarnée dans les interventions liées à l'allaitement maternel et à l'allaitement et d'illustrer comment cette reconnaissance a des implications pour les débats sur l'éthique de la santé publique. Des études récentes ont montré que les interventions d'allaitement et de soutien à la lactation compromettent l'autonomie des femmes.

[Voir.](#)

- ❖ Bodies get in the way : breastfeeding and gender equality in Swedish handbooks for new parents. 2021.

Cet article propose une analyse de trois manuels suédois populaires destinés aux nouveaux parents, rédigés par des auteurs de la « classe multimédia ». Dans ces textes, l'allaitement maternel en tant que pratique incarnée et sexospécifique se heurte à l'idéal suédois d'une parentalité égalitaire entre les sexes. L'analyse explore les différentes manières dont les corps genrés, les droits (parentaux) genrés et l'égalité des genres figurent dans les manuels, en s'appuyant sur des études féministes sur les corps et l'incarnation, et sur l'allaitement en particulier.

[Voir.](#)

- ❖ On the reflections of breastfeeding from the feminist perspective. 2020.
[Voir.](#)
- ❖ 14th Breastfeeding and Feminism International Conference : roots and wing : looking back, looking forward. 2019.
[Voir.](#)
- ❖ Féminismes et allaitement maternel en France, des années 1890 à l'an 2000. 2018.
Les féminismes ont contribué à forger la représentation de la place des femmes dans la société, mais aussi celle de la maternité. Il est donc pertinent de s'interroger sur les conceptions de l'allaitement maternel que les féministes ont développées en France des années 1890 à l'an 2000, révélant leurs convergences ou divergences selon les époques et courants. La première vague, des années 1890 à 1940, y a été largement favorable, alors que les opinions ont divergé sur ce sujet après la Seconde Guerre mondiale, notamment durant les années 1970.
[Voir.](#)
- ❖ Infant feeding and maternal guilt : the application of a feminist phenomenological framework to guide clinician practices in breast feeding promotion. 2016.
[Voir.](#)
- ❖ Féminisme biologique, allaitement et travail, une nouvelle forme d'autodétermination des femmes. 2013.
[Voir.](#)
- ❖ Expressing yourself : a feminist analysis of talk around expressing breast milk. 2009.
Des analyses féministes récentes, en particulier celles travaillant dans un cadre poststructuraliste, ont mis en évidence un certain nombre de constructions et de pratiques socioculturelles historiquement contradictoires et auxquelles les femmes sont confrontées lorsqu'elles négocient l'alimentation du nourrisson, en particulier l'allaitement maternel, dans les contextes occidentaux contemporains.
[Voir.](#)
- ❖ Breastfeeding and feminism : a focus on reproductive health, rights and justice. 2008.
Les symposiums annuels sur l'allaitement maternel et le féminisme visent à repositionner l'allaitement maternel comme un élément valorisé de la vie et des droits (re)productifs des femmes.
[Voir.](#)

Césarienne et allaitement

- ❖ The association between cesarean birth and breastfeeding initiation in Odisha, India : a mother fixed effects analysis. 2024.

Nous analysons les données de l'enquête annuelle sur la santé de l'État d'Odisha, dans l'est de l'Inde. Ces données longitudinales à l'échelle de la population sur les naissances entre 2007 et 2011 nous permettent d'estimer l'association entre l'accouchement par césarienne et les résultats de l'allaitement en utilisant les effets fixes de la mère.

[Voir.](#)

- ❖ Effect of delivery method on breastfeeding status in primiparous mothers within the first 24 hours. 2024.

Cette étude vise à évaluer l'effet du mode d'accouchement sur le statut d'allaitement des mères primipares pendant les premières 24 heures.

[Voir.](#)

- ❖ The effect of early skin-to-skin contact after cesarean section on breastfeeding duration and development of atopic-allergic diseases. 2024.

L'allaitement maternel pour renforcer le système immunitaire suggère la prévention des allergies comme une option possible. Le lien entre l'allaitement maternel et le développement de maladies allergiques atopiques est en cours de discussion. L'objectif principal de ce travail était d'étudier une association entre le premier contact peau à peau précoce après une césarienne et le développement de maladies atopiques au cours de la première année de vie.

[Voir.](#)

- ❖ 670 Peripartum factors associated with breastfeeding after cesarean birth. 2024.

L'accouchement par césarienne a été associé à des taux plus faibles d'initiation à l'allaitement maternel, mais on ne sait pas quels facteurs cliniques spécifiques du péripartum sont associés à la probabilité d'allaitement maternel après une césarienne. Notre objectif était d'analyser une vaste cohorte contemporaine prospective et diversifiée d'accouchements par césarienne aux États-Unis et d'identifier quels facteurs parmi les patientes ayant subi une césarienne sont associés à des taux plus faibles d'initiation de l'allaitement maternel.

[Voir.](#)

- ❖ Early initiation of breastfeeding up to six months among mothers after cesarean section or vaginal birth : a scoping review. 2023.

Le début précoce de l'allaitement est important pour assurer la poursuite de l'allaitement. Cependant, des recherches antérieures rapportent que la

césarienne peut entraver le démarrage précoce de l'allaitement maternel. Malgré cela, il existe actuellement un manque de littérature examinant les taux d'allaitement maternel après une césarienne et un accouchement vaginal à l'échelle mondiale.

[Voir.](#)

- ❖ Effect of caesarian section delivery on breastfeeding initiation in Nigeria : logit-based decomposition and subnational analysis of cross-sectional survey. 2023.
Cette étude examine la disparité en matière de césarienne et d'accouchement vaginal, l'impact et les contributions à l'initiation en temps opportun de l'allaitement maternel pour guider une stratégie fondée sur des données probantes pour améliorer la pratique de l'allaitement maternel.

[Voir.](#)

- ❖ Predictors and trends of caesarean section and breastfeeding in the Eastern Mediterranean region : data from the cross-sectional Cyprus Women's Health Research (COHERE) Initiative. 2023.

Il n'est pas clair si la césarienne a un impact négatif sur l'allaitement maternel et les données disponibles sur les taux de césarienne ou d'allaitement maternel dans le nord de Chypre, une région émergente d'Europe. Cette étude visait à étudier la prévalence, les tendances et les associations entre la césarienne et l'allaitement maternel dans cette population.

[Voir.](#)

- ❖ Identification of barriers to exclusive breastfeeding for post sectio caesarea mothers in Paya Pasir Village, Marelán District. 2023.

Il est important de soutenir l'allaitement des femmes après une césarienne pour ajuster leurs attitudes, leurs systèmes de croyance et leur environnement externe, ainsi que pour les aider à améliorer leur confiance en elles. Le soutien informationnel fourni par les agents de santé constitue un premier effort visant à influencer la compréhension des mères et des familles sur les avantages de l'allaitement maternel.

[Voir.](#)

- ❖ Association of duration of skin-to-skin contact after cesarean delivery in China : a superiority, multicentric randomized controlled trial. 2023.

Cette étude visait à déterminer l'association entre la durée du contact peau à peau après un accouchement par césarienne et les résultats de l'allaitement maternel et les résultats en matière de santé maternelle et néonatale en Chine.

[Voir.](#)

- ❖ Effectiveness of an early skin-to-skin contact program for pregnant women with cesarean section : a quasi-experimental trial. 2023.

Un programme « contact peau à peau précoce après césarienne » a été mis en œuvre dans un hôpital de soins tertiaires en Tanzanie. Un plan de groupe non équivalent a été utilisé. Un questionnaire a été utilisé pour collecter des données sur l'allaitement exclusif, l'intention d'allaitement, le score de l'indicateur révisé de l'échelle de satisfaction à la naissance, la douleur périopératoire avec une échelle visuelle analogique et l'hospitalisation du nourrisson pour maladies infectieuses et diarrhée 2 à 3 jours après l'accouchement.

[Voir.](#)

- ❖ Impact of postoperative pain on early initiation of breastfeeding and ambulation after cesarean section : a randomized trial. 2023.

Objectif : comparer l'effet de différents schémas analgésiques sur le délai de début de l'allaitement et de la marche après une césarienne.

[Voir.](#)

- ❖ Breastfeeding after a cesarean section : a literature review. 2021.

Selon la littérature publiée, les taux d'allaitement maternel et d'allaitement exclusif dans le monde sont relativement faibles, en particulier après une césarienne. Par conséquent, cette revue vise à résumer les données existantes sur la césarienne et la performance de l'allaitement dans le monde entier afin d'interpréter davantage leur relation.

[Voir.](#)

- ❖ Relationship between caesarean section and breastfeeding : evidence from the 2013 Turkey demographic and health survey. 2020.

Le mode d'accouchement influence les pratiques d'allaitement. Les taux élevés de césarienne et les faibles taux d'allaitement maternel constituent d'importantes préoccupations de santé publique pour tous les pays en développement. Cette étude visait à déterminer la relation entre la césarienne et les pratiques d'allaitement précoce chez les primipares.

[Voir.](#)

- ❖ Effect of cesarean section on initiation of breast feeding : findings from 2016 Ethiopian Demographic and Health Survey. 2020.

Les accouchements par césarienne peuvent affecter le moment du début de l'allaitement, l'établissement de la production de lait et l'intérêt du nourrisson pour l'allaitement par rapport aux accouchements par voie vaginale. Le but de cette étude était d'évaluer l'impact de l'accouchement par césarienne sur l'initiation de l'allaitement.

[Voir.](#)

- ❖ The impact of caesarean section on breastfeeding initiation, duration and difficulties in the first four months postpartum. 2016.

Les césariennes d'urgence et planifiées peuvent avoir un effet négatif sur l'initiation de l'allaitement, la production de lait et réceptivité à l'allaitement maternel par rapport aux accouchements vaginaux. Notre étude a examiné le mode d'accouchement et l'initiation de l'allaitement, la durée et les difficultés signalées par les mères 4 mois après l'accouchement.

[Voir.](#)

❖ **Césarienne, allaitement et douleur. 2012.**

L'accouchement par césarienne a un impact négatif sur l'allaitement. La douleur pourrait être un frein à l'allaitement. La douleur aiguë en suite de césarienne est également responsable de douleurs chroniques et de dépressions. La prise en charge de la douleur est donc une composante importante de la réhabilitation après une césarienne.

[Voir.](#)

❖ **Breastfeeding after cesarean delivery : a systematic review and meta-analysis of world literature. 2012.**

L'objectif est de mener une revue systématique et une méta-analyse d'études observationnelles pour déterminer si l'accouchement par césarienne (avant le travail ou pendant le travail) est associé à un taux d'allaitement inférieur par rapport à l'accouchement vaginal.

[Voir.](#)

❖ **L'allaitement maternel, un véritable challenge après une césarienne. 2011.**

[Voir.](#)

Dépression du post-partum et allaitement

- ❖ Association between breastfeeding cessation among under six-month-old infants and postpartum depressive symptoms in Nevada. 2024.

La dépression post-partum touche 13 % des femmes après l'accouchement aux États-Unis. Les mères souffrant de dépression sont moins susceptibles d'allaiter que celles qui ne souffrent pas de dépression. D'un autre côté, l'allaitement peut avoir un effet positif sur la santé mentale de la mère.

[Voir.](#)

- ❖ Postpartum depression and partner support during the period of lactation : correlation research and its influencing factors. 2024.

But : explorer la corrélation entre la dépression post-partum et le soutien du partenaire pendant l'allaitement et ses facteurs d'influence.

[Voir.](#)

- ❖ The impact of maternal common mental disorders on exclusive breastfeeding in Eastern Ethiopia : a prospective cohort study. 2024.

Les troubles mentaux courants chez la mère et les pratiques inadéquates d'alimentation des enfants constituent d'importants problèmes de santé publique en Éthiopie. Néanmoins, l'impact des troubles mentaux sur les pratiques d'alimentation du nourrisson reste mal compris. Par conséquent, l'objectif de cette recherche était d'examiner l'impact des troubles mentaux sur la pratique de l'allaitement maternel exclusif dans les districts ruraux de l'est de l'Éthiopie.

[Voir.](#)

- ❖ Investigating maternal stress, depression, and breastfeeding : a pregnancy risk assessment monitoring system (2016–2019) analysis. 2023.

L'allaitement est inestimable pour la guérison physique et le bien-être mental post-partum, mais le stress psychosocial et la dépression entravent ces processus de récupération. Pour éclairer les interventions et politiques futures, les associations entre l'allaitement maternel, le stress maternel et la dépression ont été examinées. Les données du système de surveillance de l'évaluation des risques de grossesse ont été analysées (2016-2019).

[Voir.](#)

- ❖ Postpartum depression is associated with maternal sociodemographic and anthropometric characteristics, perinatal outcomes, breastfeeding practices, and mediterranean diet adherence. 2023.

Cette enquête vise à déterminer l'association possible de la dépression post-partum avec les caractéristiques sociodémographiques et anthropométriques

des mères, les issues périnatales, les pratiques d'allaitement et l'adhésion au régime méditerranéen.

[Voir.](#)

- ❖ Increased risk of postpartum depression in women with lactational mastitis: a cross-sectional study. 2023.

Une incidence élevée de mammite lactationnelle survient principalement au cours du premier mois d'allaitement. Cela peut provoquer des douleurs intenses, de la frustration, de la fatigue, du stress et des problèmes d'allaitement. Cependant, peu d'études ont étudié les effets de la mammite lactationnelle sur la dépression post-partum. Cette étude a examiné l'association potentielle entre la mammite lactationnelle et la dépression post-partum.

[Voir.](#)

- ❖ Associations between pressure to breastfeed and depressive, anxiety, obsessive-compulsive, and eating disorder symptoms among postpartum women. 2023.

Le but de la présente étude était d'évaluer les associations entre la pression perçue pour allaiter provenant de diverses sources et les symptômes dépressifs, anxieux, obsessionnels-compulsifs et de troubles de l'alimentation chez les personnes en post-partum.

[Voir.](#)

- ❖ Relationships between postpartum depression, sleep, and infant feeding in the early postpartum : an exploratory analysis. 2023.

Les objectifs de l'étude étaient de déterminer les relations entre la dépression post-partum et les paramètres du sommeil maternel et infantile et d'examiner l'impact de la méthode d'alimentation du nourrisson sur le sommeil du nourrisson et de la mère et la symptomatologie de la dépression post-partum.

[Voir.](#)

- ❖ The effect of exclusive breastfeeding time on mother-infant attachment and postpartum depression level. 2023.

Le but de cette étude était d'évaluer la durée de l'allaitement et l'effet de l'allaitement maternel au niveau de l'attachement mère-enfant et de la dépression post-partum.

[Voir.](#)

- ❖ The significance of breastfeeding practices on postpartum depression risk. 2022.

Les résultats de l'étude suggèrent que l'allaitement maternel est un comportement sain et rentable qui peut diminuer le risque de dépression post-partum chez la femme. Les infirmières doivent éduquer et promouvoir les

bienfaits de l'allaitement maternel sur la santé mentale de la mère, en plus des bienfaits pour la santé du nourrisson.

[Voir.](#)

- ❖ Association between breastfeeding and postpartum depression : a meta-analysis. 2022.

Nos résultats montrent une association entre dépression post-partum et allaitement. Pour confirmer cette conclusion, d'autres études portant sur des échantillons de grande taille sont nécessaires.

[Voir.](#)

- ❖ Positive effect of breastfeeding on child development, anxiety, and postpartum depression. 2020.

La dépression post-partum est un trouble psychiatrique qui apparaît de la deuxième à la sixième semaine après la naissance. L'allaitement est considéré comme un facteur de protection contre les sautes d'humeur post-partum. Cet article vise à examiner l'effet de l'allaitement maternel sur la dépression et l'anxiété post-partum, et comment cela affecte le développement de l'enfant.

[Voir.](#)

- ❖ Consequences of maternal postpartum depression : a systematic review of maternal and infant outcomes. 2019.

Les résultats des études ont été synthétisés en trois catégories : les conséquences maternelles de la dépression post-partum, y compris la santé physique, la santé psychologique, les relations et les comportements à risque ; les conséquences infantiles de la dépression post-partum, y compris l'anthropométrie, la santé physique, le sommeil et le développement moteur, cognitif, langagier, émotionnel, social et comportemental ; et les interactions mère-enfant, y compris les liens, l'allaitement et le rôle maternel.

[Voir.](#)

Lieux publics et allaitement

- ❖ Women's perceptions of factors needed to encourage a culture of public breastfeeding : a cross-sectional study in Sweden, Ireland and Australia. 2023.
L'expérience commune qui existe aujourd'hui en matière d'allaitement public nécessite un changement vers une normalisation. Des recherches collaboratives plus poussées sont recommandées pour répondre aux besoins exprimés par les femmes qui souhaitent allaiter en public.
[Voir.](#)
- ❖ 'Surely a little discretion isn't too difficult'? The discursive construction of discretion in users' comments on UK newspaper articles about public breastfeeding. 2023.
Cet article explore la façon dont les discours sur la discrétion sont construits dans les discussions en ligne sur l'allaitement en public.
[Voir.](#)
- ❖ Australian, Irish, and Swedish women's comfort levels when breastfeeding in public. 2023.
Cette étude offre des informations importantes sur les expériences et les niveaux de confort des femmes qui allaitent en public. Les limites incluent la nature anonyme des enquêtes, empêchant ainsi le suivi, et les variations dans la terminologie utilisée pour décrire les emplacements dans les trois contextes.
[Voir.](#)
- ❖ The influence of bystander presence on evaluations of public breastfeeding among adults in the United States. 2023.
La présence de spectateurs peut avoir plus de conséquences que l'emplacement physique pour façonner les réactions à l'allaitement en public. Ces résultats peuvent être appliqués pour améliorer le soutien à l'allaitement public, ce qui pourrait contribuer à des taux d'allaitement plus élevés et aux bénéfices associés pour la santé publique.
[Voir.](#)
- ❖ Stigmatization and confrontation of breastfeeding in public. 2023.
Malgré les bienfaits incontestables de l'allaitement maternel sur la santé des nourrissons et des mères, la stigmatisation et les défis associés à l'allaitement en public persistent, même dans les pays développés comme le Royaume-Uni. Cet article se penche sur les barrières sociétales persistantes qui dissuadent les mères d'allaiter ouvertement leurs nourrissons et sur l'impact qui en résulte sur la santé maternelle et infantile.

[Voir.](#)

- ❖ The theoretical concept of "Breastfeeding space" portrayed in the World Breastfeeding Week campaigns*. 2023.

Objectif : analyser la manière dont les espaces d'allaitement sont représentés dans les affiches de la Campagne nationale pour l'allaitement maternel, à la lumière de la théorie interactive de l'allaitement maternel.

[Voir.](#)

- ❖ The practice of breastfeeding in public and its associated factors among egyptian mothers. 2023.

La pratique de l'allaitement en public est associée aux normes sociales perçues. Aucune connaissance suffisante n'est disponible concernant cette pratique, les attitudes qui y sont liées et les facteurs importants associés en Égypte.

[Voir.](#)

- ❖ What makes a city 'breastfeeding-friendly'? A scoping review of indicators of a breastfeeding-friendly city. 2023.

[Voir.](#)

- ❖ Views and experience of breastfeeding in public : a qualitative systematic review. 2022.

Les taux d'allaitement maternel dans de nombreux pays du Nord sont faibles. Les recherches qualitatives soulignent que l'allaitement en public constitue un défi particulier, même si les mères en ont souvent le droit légal. Pour identifier les obstacles et les facilitateurs, nous avons systématiquement recherché les recherches qualitatives des pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques concernant l'allaitement maternel dans les espaces publics de 2007 à 2021.

[Voir.](#)

- ❖ Breastfeeding during travel : barriers and informational support for mothers traveling with or without infants. 2022.

Une revue de la littérature grise et factuelle a été entreprise pour examiner les principales considérations entourant l'allaitement pendant le voyage aérien, les obstacles rencontrés par les mères allaitantes lors d'un voyage et le soutien informationnel basé sur les besoins pour les mères allaitantes voyageant avec ou sans leur nourrisson.

[Voir.](#)

- ❖ Factors affecting attitude towards breastfeeding in public : a cross-sectional web-based study on Polish women. 2022.

L'allaitement maternel est considéré comme bénéfique à la fois à la mère et à l'enfant. Bien que le pourcentage de mères polonaises qui commencent à allaiter après l'accouchement soit relativement élevé, la plupart d'entre elles terminent après 8 à 12 semaines. De nombreux facteurs entrent en jeu dans la décision d'arrêter, notamment une attitude sociale défavorable à l'égard de l'allaitement en public.

[Voir.](#)

- ❖ Perception and practice of breastfeeding in public in Poland. 2022.

Le but de l'étude est de connaître les opinions et les expériences des femmes polonaises concernant l'allaitement en public.

[Voir.](#)

- ❖ The availability and effectiveness of lactation rooms usage in shopping centers (case study in metropolitan Jakarta). 2021.

La disponibilité et l'efficacité de l'utilisation des salles de lactation dans les centres commerciaux (étude de cas dans la région métropolitaine de Jakarta).

[Voir.](#)

- ❖ An evaluation of on-campus lactation spaces for student-parents. 2021.

Le but de cette étude était d'évaluer la disponibilité, l'accessibilité, l'acceptabilité et la qualité des espaces de lactation existants sur le campus.

[Voir.](#)

- ❖ Breastfeeding in public and the impact of mass media on breastfeeding : an expanded literature review. 2021.

Cette revue de la littérature évalue les attitudes à l'égard de l'allaitement maternel en public et la manière dont les différents formats médiatiques peuvent avoir un impact sur les perceptions de l'allaitement maternel et potentiellement sur sa mise en œuvre.

[Voir.](#)

- ❖ Breasts and the city : an urban ethnography of infant feeding in public spaces within Cardiff, United Kingdom. 2021.

À l'échelle internationale, les femmes signalent des difficultés à allaiter dans les espaces publics. Cette étude visait à étudier les aspects socio-spatiaux des espaces publics dans une ville britannique, Cardiff, afin de suggérer d'éventuels obstacles et facilitateurs à l'allaitement dans les espaces publics.

[Voir.](#)

- ❖ Helpful and challenging aspects of breastfeeding in public for women living in Australia, Ireland and Sweden : a cross-sectional study. 2020.

L'allaitement en public continue de susciter des controverses, les preuves qualitatives confirmant que les femmes sont confrontées à de nombreux défis.

Il est donc important de comprendre non seulement les défis, mais également ce que les femmes considèrent comme utile d'allaiter en public.

[Voir.](#)

- ❖ Perceptions of mothers and community members regarding breastfeeding in public spaces in Alexandra, Gauteng Province, South Africa. 2020.

Les mères rencontrent des obstacles importants pour allaiter dans les espaces publics, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé en faveur de l'allaitement exclusif. Le fait de ne pas soutenir et accepter l'allaitement dans les espaces publics pourrait conduire à une alimentation mixte, voire à l'abandon de l'allaitement.

[Voir.](#)

- ❖ Young adults' perceptions of breastfeeding in public : a focus-group study. 2020.

Objectif : Élucider les perceptions des jeunes adultes chinois âgés de 18 à 25 ans concernant l'adoption de l'allaitement maternel en public dans la région administrative spéciale de Hong Kong (Hong Kong), Chine.

[Voir.](#)

- ❖ It's okay to breastfeed in public but... 2019.

Le but de cet article est de présenter les résultats d'une étude australienne qui a exploré les perceptions et les croyances des femmes enceintes pour la première fois, de leur famille et de leurs réseaux sociaux à l'égard de l'allaitement en public.

[Voir.](#)

- ❖ Reconfiguring the breastfeeding body in urban public spaces. 2019.

Le corps qui allaite est soumis à des formes manifestes et subversives de régulation et de contrôle dans la société contemporaine, où il est sexualisé et naturalisé, rendu à la fois visible et invisible, vénéré et considéré comme perturbateur. Malgré une politique de santé qui reconnaît les bienfaits de l'allaitement maternel pour la mère et l'enfant, les taux de durée de l'allaitement au Canada demeurent relativement faibles.

[Voir.](#)

- ❖ Place of sanctuary : an appreciative inquiry approach to discovering how communities support breastfeeding and parenting. 2019.

L'allaitement maternel et la parentalité sont ancrés dans les lieux où vivent les femmes et les familles. Les espaces communautaires, y compris les centres commerciaux, devraient être conçus pour inclure les nourrissons et les jeunes enfants et offrir des installations appropriées telles que des salles parentales sûres et propres.

[Voir.](#)

- ❖ Reconfiguring the breastfeeding body in urban public spaces. 2018.
Le corps qui allaite est soumis à des formes manifestes et subversives de régulation et de contrôle dans la société contemporaine, où il est sexualisé et naturalisé, rendu à la fois visible et invisible, vénéré et considéré comme perturbateur. Malgré une politique de santé qui reconnaît les bienfaits de l'allaitement maternel pour la mère et l'enfant, les taux de durée de l'allaitement au Canada demeurent relativement faibles.
[Voir.](#)
- ❖ Experiences and perspectives about breastfeeding in "public" : a qualitative exploration among normal-weight and obese mothers. 2018.
Les femmes sont confrontées à des obstacles sociétaux et culturels à l'allaitement. Ces défis ont été étudiés dans des études internationales et des sondages d'opinion publique américains ; cependant, les expériences des mères en matière d'allaitement en public aux États-Unis restent inexplorées. Le but de cette étude était de décrire les expériences de femmes obèses et de poids normal allaitantes en public dans le centre de New York.
[Voir.](#)
- ❖ Is breastfeeding in public socially accepted? : experiences and attitudes of the general population and breastfeeding mothers. 2018.
Les objectifs étaient de recueillir des données actuelles sur la perception et l'acceptation de l'allaitement maternel en public.
[Voir.](#)
- ❖ Public attitudes toward breastfeeding in public places in Ottawa, Canada. 2017.
En Ontario, au Canada, l'allaitement en public est un droit protégé, mais même avec ces lois, les attitudes à l'égard de l'allaitement en public peuvent constituer un obstacle à l'allaitement. Cette étude évalue le soutien du public à l'allaitement en public chez les adultes d'Ottawa, en Ontario, et examine les associations sociodémographiques avec les attitudes négatives à l'égard de l'allaitement en public.
[Voir.](#)
- ❖ The ability of posters to enhance the comfort level with breastfeeding in a public venue in rural Newfoundland and Labrador. 2016.
L'objectif principal de cette étude était de déterminer si des affiches destinées au grand public pouvaient améliorer l'acceptabilité de l'allaitement dans les lieux publics.
[Voir.](#)
- ❖ UK views toward breastfeeding in public : an analysis of the public's response to the Claridge's incident. 2016.

Cette étude visait à évaluer les opinions sur l'allaitement maternel en public au Royaume-Uni et à comprendre pourquoi certains résidents britanniques s'opposent à cette pratique.

[Voir.](#)

❖ **Breastfeeding in public : "You can do it?" 2014.**

Il y a régulièrement des tollés à propos d'une mère à qui on demande de se couvrir ou de s'éloigner d'un lieu public pendant qu'elle allaite. Les mères devraient se sentir libres d'allaiter quand elles en ont besoin. Cependant, le marché croissant des « couvertures d'allaitement » destinées à cacher le sein pendant l'allaitement témoigne d'un changement de perception. L'inconfort suscité par l'idée d'allaiter en public a été cité comme raison pour laquelle certaines femmes choisissent de ne pas commencer à allaiter ou planifient une durée d'allaitement plus courte.

[Voir.](#)